

AVERTISSEMENTS AGRICOLES**LORRAINE**

Bulletin n° 14 du 1er juin 1994

GRANDES CULTURES

- Tournesol** - Pucerons : Premières colonies.
 - Mildiou : Rechercher.
Blé - Traitement épiaison.

Tournesol

Les tournesols atteignent le stade 5 paires de feuilles dans de nombreuses situations.

Pucerons

Des colonies sont visibles sur les feuilles. Les conditions climatiques actuelles sont favorables à leur pullulation, mais la présence importante des auxiliaires devraient les réduire rapidement.

N'intervenir que si le seuil est atteint.

Rappel seuils :

- de la levée à B5 : 30 à 50 pucerons par plante
- de B5 à E : 50 à 100 pucerons par plante.

**Pulvériser quand
le risque est faible ...**



**... c'est comme pulvériser
dans un violon.**

Mildiou

L'infection conduit le plus souvent à l'expression typique de raccourcissement des entre-nœuds et de nanisme. Sur les feuilles atteintes apparaît une mosaïque chlorotique (décoloration) qui s'étend le long des nervures pour recouvrir ensuite la totalité du limbe. Un feutrage blanc (fructification du champignon) recouvre la face inférieure des feuilles au niveau des zones atteintes.

Si vous avez observé ces symptômes sur vos parcelles, malgré le traitement de semence, merci de nous en informer ; une cartographie de la présence du mildiou sur tournesol en France sera, en effet, établie lors de la campagne 1994. Le SRPV de Lorraine y participera.

Blé

La majorité des blés épient.

Comme nous l'avions annoncé, la septoriose se développe et gagne les F2 dans les parcelles non encore traitées.

La rouille brune est visible sur F2 et F3 dans quelques situations, ainsi que l'oïdium dans les parties basses.

Spécial Présept

Les contaminations continuent et la pression de la septoriose ne devrait pas baisser dans les prochains jours, surtout dans les secteurs qui recevront les orages annoncés en fin de semaine.

Préconisations :

La protection contre septoriose et rouille définie dans nos derniers bulletins reste valable :

- Renouvellement du traitement des blés ayant reçu une protection au stade 2 nœuds ou une triazole autre que Opus au stade dernière feuille sortie.
- Toute triazole efficace sur les deux maladies est valable.
- Toute réduction de dose est déconseillée.

P397

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



310 F

ABONNEMENT ANNUEL